

# 新冠肺炎感染症

## 进入「第6波」 奥密克戎变异病毒紧急对策(摘要)

令和4年1月11日  
岐阜县新冠肺炎感染症对策本部

目前全国范围内奥密克戎变异病毒感染扩散，正处于「第6波」感染高峰期。元旦以后，在本县内感染者急剧增加，需要警惕史无前例的感染爆发。

为了保护自己，珍贵的家人的生命，社区和经济，请各位县民一如既往的做好疫情防护措施。

### 【奥密克戎变异病毒的特征】

- 感染力之强是德尔塔变异病毒的3倍。
- 出现症状为止的潜伏期间，德尔塔变异病毒约5日，奥密克戎变异病毒约为3日。（本县的感染病例）
- 2回疫苗接种后，经过20~24周，症状预防效果降低至10%左右。（英国的报告）

※本县内奥密克戎变异病毒确诊感染者的大半都是已经接种过疫苗。

### 【加强疫情防护措施】

#### 1 彻底做好最基本的疫情预防措施

- 持续做好「基本的疫情预防措施」

① 佩戴口罩、②保持手指卫生、③回避密集状态、④勤通风换气、⑤身体状况不好时停止一切活动

- 避免高风险感染的以下「5个场面」

① 伴随着饮酒的聚会，②多人数和长时间的用餐，③对话时不佩戴口罩，④在宿舍和洗手间等公共使用场所要注意，⑤休息室·更衣室·吸烟室等地方要注意

#### 2 出行

- 尽量避免无紧急要事的情况下，前往重点措施区域等感染严重的地域。

#### 3 用餐

- 避免多人，长时间用餐。（4人为止、2小时为止为参考标准）