

# Omicron Variant Expansion Prevention!!

**Mga katangian ng Omicron strain**


**Malakas Makahawa**

**Magkakasakit kaagad**

**May posibilidad na mahawa kahit na may 2nd bakuna**

Ang mga sintomas ay mas malakas kumpara sa karaniwang sipon, na ginagawang imposibleng magtrabaho ng ilang araw, atbp.

Gayunpaman, mapipigilan ito ng Basic Infection Control measures.



## Pag-isipan kunin ang 3<sup>rd</sup> o Booster shot

Mas mahalagang magpabakuna sa lalong madaling panahon kaysa sa uri ng bakuna!

Anuman ang ginamit na bakuna para sa 3<sup>rd</sup> dose, ang resistensya (antibody level) ay tumataas nang malaki.

Pagkatapos ng 3 <sup>rd</sup> pagbabakuna		Gawa ng Pfizer	Gawa ng Moderna
Antibody Level (28 days pagkatapos magpabakuna)		54.1 times	67.9 times
Side Effect Rate ng bakuna	Lagnat na 38 °C o higher	21.4%	49.2%
	Sobrang pagod ng katawan	69.1%	78.0%
	Headache	55.0%	69.6%

※Mataas ang posibilidad lumitaw ng side effects 1day pagkatapos magpabakuna at halos nawawala ito pagkatapos ng 3 araw (ayon ito sa data na inilabas ng Ministry of Health, Labor and Welfare).

## Mag-ingat sa mga Spring Events

Iwasan ang mga aktibidad na may mataas na peligro ng impeksyon, tulad ng Easter party, paglabas sa mataong lugar, cherry blossom viewing at iba pa.