

COVID-19

Prevenção contra a propagação da Variante Ómicron

Características da Variante Ómicron


Forte transmissibilidade

Rápida
manifestação
de sintomas

Há possibilidade de se infectar
mesmo já tendo recebido a 2ª
dose da vacina

Seu trabalho e atividades podem ficar pausados devido aos fortes sintomas que ultrapassam as gripes convencionais.

Lembre-se que é possível evitá-la através de medidas básicas de prevenção contra infecções.



Considere a aplicação da 3ª dose

É importante aplicar a vacina o mais rápido possível.

Pesquisas constataram um grande aumento de resistência corporal (índice de anticorpos) ao aplicar a 3ª dose da vacina Pfizer ou Moderna.

Após a aplicação da 3ª dose		Pfizer	Moderna
Índice de anticorpos (28 dias após a vacinação)		5 4.1 vezes	6 7.9 vezes
Porcentagem de Reações colaterais	Febre acima de 38°C	21.4%	49.2%
	Desconforto	69.1%	78.0%
	Dor de cabeça	55.0%	69.6%

※Na maioria dos casos as reações colaterais se intensificam no dia seguinte, e logo desaparecem depois de 3 dias. (Dados publicados pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar)

Atenção durante a primavera

Evite atividades com grandes riscos de infecção como, passeios em locais aglomerados, festas de páscoa ou de primavera em grandes números.